

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

протокол № ____ от «11» IX 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель

Приказ № 24 от "11". IX. 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда

«__» _____ 20__ г.

Инструкция *K6-2* по действию персонала в случае выявления работника с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к действиям сотрудников, при выявлении работников с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Куобахчаан», при выявлении заболевшего среди членов семьи, а также обозначает ответственность.

1.2. Действие данной инструкции распространяется на всех работников МБДОУ «ЦРР – детский сад «Куобахчаан». Разработана с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди работников и сбережения здоровья персонала.

1.3. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус, который передается двумя способами:

- воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле или чихании;
- контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае заражение происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками.

1.4. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают как ОРВИ в легкой форме, не вызывающей тяжелых симптомов. Встречаются и тяжелые формы, такие, как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars).

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп.

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции:

- повышенная температура;
- затрудненное дыхание;
- чихание, кашель, заложенность носа;
- боль в мышцах и груди;
- головная боль и слабость;
- першение или боль в горле,
- реже возможна тошнота, рвота и диарея.